

**PREPARO PARA COLONOSCOPIA  
(EXAME NO PERÍODO DA MANHÃ)**

PACIENTE: \_\_\_\_\_  
EXAME MARCADO PARA O DIA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ÀS \_\_\_\_\_ HORAS

(Comparecer 20 minutos antes do horário marcado)

**O OBJETIVO DO PREPARO É PROVOCAR DIARRÉIA PARA LIMPAR O INTESTINO.**  
EM CASO DE CONSTIPAÇÃO (PRISÃO DE VENTRE), ENTRAR EM CONTATO COM O SETOR DE ENFERMAGEM PARA ORIENTAÇÕES.

**NO DIA ANTERIOR**

**CAFÉ DA MANHÃ:** água, chás claros, água de coco, Gatorade, suco natural coado, geleia, gelatina clara, bolacha de água e sal, torrada, pão francês (sem manteiga).

**ALMOÇO:** Canja, sopa (sem legumes, verduras ou folhas), gelatina, arroz, macarrão, frango ou peixe grelhados.

**Às 15horas** tomar 03comprimidos de **DULCOLAX** ou **LACTOPURGA** ou **HUMECTOL D**.

**JANTAR:** entre **19horas e 20 horas** → igual ao café da manhã.

**NÃO COMER** alimentos ricos em fibras (verduras, frutas, legumes, cereais), leite e derivados.  
**APÓS O JANTAR, NÃO CONSUMIR MAIS ALIMENTOS SÓLIDOS.**

**TOMAR BASTANTE LÍQUIDO DURANTE TODO O DIA** (água, chá, água de coco, gatorade, suco natural coado).

**NÃO CONSUMIR LÍQUIDOS VERMELHOS OU ESCUROS.**

**NO DIA DO EXAME**

Às 03 horas da manhã TOME 1 COMPRIMIDO DE **PLASIL**, OU **DRAMIN**, OU **VONAU FLASH 4mg**.

Caso faça uso de medicamento para pressão alta, tome nesse horário.

**Às 04horas da manhã:**

ADICIONAR EM UM RECIPIENTE:

200ml de **Lactulose xarope** (Duphalac® ou Farlac®);

01 frasco de **Simeticona** de 10 ou 15ml;

300ml de líquido de sua preferência (água gelada, ou suco de limão coado e gelado ou Gatorade sabor limão). **NÃO USAR LÍQUIDOS DE COR ESCURA.**

**Tomar** 01 copo dessa solução a cada 10 minutos.

É NECESSÁRIO TOMAR BASTANTE LÍQUIDO, COMO CHÁ, ÁGUA DE COCO, GATORADE, SUCO NATURAL COADO, APÓS O USO DA LACTULOSE.

EVITAR LÍQUIDOS VERMELHOS E ESCUROS.

**NÃO CONSUMIR ALIMENTOS SÓLIDOS ATÉ A REALIZAÇÃO DO EXAME.**

**JEJUM ABSOLUTO A PARTIR DE 03 HORAS ANTES DO EXAME (inclusive de água e outros líquidos, chicletes e balas).**

**SE RESTAR ALGUMA DÚVIDA LIGUE →3273-9950; 3032-9200; 99696-5415; 99696-5416;**

**OUTRAS ORIENTAÇÕES IMPORTANTES NO VERSO**

## ORIENTAÇÕES GERAIS

- Comparecer 20 minutos antes do horário marcado, com a autorização do convênio;
- O exame só será realizado se o paciente se apresentar com acompanhante maior de idade.
- Após o exame, recomendamos permanecer em casa pelo resto do dia, acompanhado, em repouso nas primeiras horas;
- Pelo resto do dia, é proibido atividade física, dirigir veículo ou operar máquinas que ponham em risco sua integridade.
- Medicamentos para pressão alta devem ser tomados com um pouco de água o mais cedo possível.
- Quem usa “bombinha” para asma deve usá-la normalmente e trazê-la consigo. Outros medicamentos só após o exame;
- **Quem, por alguma razão, usa anti-agregantes plaquetários (Clopidogrel, Plavix, Ticlopidina, Ticlid, Prasugrel, Ticagrelor) ou anti-coagulantes (Apixaban, Rivaroxaban, Xarelto, Warfarin, Coumadin, Marcoumar, Marevan, Heparina), informe a atendente da clínica, a enfermeira e/ou ao médico que fará seu exame, para que ele, se for o caso, tome as medidas necessárias;**
- **Quem, por alguma razão, faz uso de medicações que retardam o esvaziamento gástrico (Saxenda, Ozempic (Semaglutida), Victoza, Trulicity (Dulaglutida), informe a atendente da clínica, a enfermeira e/ou ao médico que fará seu exame, para que ele, se for o caso, tome as medidas necessárias;**
- Trazer exames anteriores, se tiver (colonoscopia, exames cardiológicos).
- Usar roupa e calçado confortáveis, não usar esmalte, batom e adornos (relógios, brincos, anéis, pulseiras, colares e piercing).
- Retirar e deixar com o acompanhante todos os pertences e adornos.
- Caso queira, trazer uma muda de roupa extra.
- Retirar esmalte das unhas das mãos, pois o mesmo dificulta a leitura dos parâmetros de oxigenação sanguínea durante o exame.
- Caso não possa comparecer no dia marcado, procure remarcar com 48 horas de antecedência, para que o horário seja liberado para outro paciente.